LTO! LEA EL PANFLETO ANTES DE USAR EL PRODUCTO Y ONSULTE AL PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRÍCOLAS.

UPL

NDOZEB PLUS 80 WP

FUNGICIDA-DITIOCARBAMATO MANCOZEB

PRECAUCIÓN

ANTÍDOTO: NO TIENE

PRODUCTO PUEDE SER MORTAL SI SE INGIERE Y/O SE A PUEDE CAUSAR DAÑOS A LOS OJOS Y A LA PIEL POR EXPOSICIÓN

"NO ALMACENAR EN CASAS DE HABITACIÓN" TÉNGASE ALEJADO DE LOS NIÑOS, PERSONAS MENTE INCAPACES, ANIMALES DOMÉSTICOS, ALIMENTOS Y MEDICAMENTOS.

AGRONÓMICO

O DE ACCIÓN: El mancozeb es un fungicida ditio-amato de acción de contacto, siendo su uso un tratamiento ntivo, es decir se debe de utilizar antes de que se presenten omas de la enfermedad. El Zinc disminuye la fitotoxicidad maneb y mejora las propiedades fungicidas. Actúa en la ducción de energía al reaccionar con grupos SH de proteínas, almente enzimas, dentro de la célula, ocurriendo una multisitio. Por otra parte, la aplicación debe de cubrir la e del vegetal que se trate en forma uniforme y total. se corrigen las deficiencias de manganeso y zinc.

O DE APLICACIÓN: Al aplicar Vondozeb 80 WP, utilice de aspersión terrestre o aérea. Se puede aplicar a bajo n (20 litros/hectárea) o con equipos convencionales a hasta 600 litros/hectárea. El mismo debe estar en estado de funcionamiento y sin fugas. Debe calibrarse agua y verificar bien la descarga del mismo. Por lo anteri- reciso utilizar una presión constante y boquillas de la Systems Co preferiblemente la xr teejet extended range teejet estandard (8002) o similares de otra marca. El ozeb 80 WP no produce daño al equipo de aplicación.

A DE PREPARACIÓN DE LA MEZCLA: El producto debe erse en una porción de agua, mezclando bien y luego comple- umen a emplear. Recuerde primero disolver los polvos y antemente agitando la mezcla y al finalizar lave con abun- el equipo.

El equipo y los utensilios empleados en la mezcla y aplicación deben ser con suficiente agua después de cada jornada de trabajo. Desc aguas de lavado en un hueco o en lugares especiales para lejos de fuentes de agua. Debe de usar guantes y botas de hu el lavado del equipo de aplicación.

PRECAUCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO: Usos re dados Costa Rica

Cultivo	Enfermedad a controlar	Dosis de a
Ajo: Allium sativum	Mildiu velloso Peronospora destructor	Aplique 1,5 a
Cebolla: Allium cepa	Mancha de la hoja Botrytis squamosa Mancha púrpura Alternaria porri	0,50 a 0,75 k agu
Banano: Musa spp	Sigatoka amarilla Mycosphaerella musicola Sigatoka negra Mycosphaerella fijiensis var. difformis	En aplicaciones a ciclos de 15-22 días kg/ha + 3,785 L de acei agrícola en 4 galones d agua.
Chile: Capsicum annuum	Antracnosis Colletotrichum sp. Mancha foliar Cercospora spp.	1,5 a 2,25 kg/ha o 0,5 kg en 200 L de ag
Frijol: Phaseolus vulgaris	Antracnosis Colletotrichum sp. Mancha foliar Cercospora capsici Mal del talluelo Rhizoctonia solani o Pythium sp. Tizón foliar Phytophthora capsici	1,5 a 2,25 kg/ha kg en 200
Melón: Cucumis melo Pepino: Cucumis sativus	Antracnosis Colletotrichum lagenarium Quema Mycosphaerella citrulina Mildiu velloso Pseudoperonospora cubensis	1,5 a 3 k 200 L d
Papa: Solanum tuberosum	Tizón tardío Phytophthora infestans Tizón temprano Alternaria solani	2,25 a 4,5 kg/ha kg en 200 L
TOMATE Solanum lycopersicum	Tizón temprano Alternaria solani Tizón tardío Phytophthora infestans Mal del talluelo Rhizoctonia solani Antracnosis Colletotrichum phomoides	2,25 a 4,5 k kg en 20
Mango Mangifera indica	Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides	Utilice 3 kg/ha d 200 L de ag
REPOLLO Brassica oleracea	Mildiu velloso Peronospora parasitica Mancha foliar Alternaria brassicae	Use a razón de 1,8 200 L de caldo, proc una buena cobertura follaje.
PAPAYA Carica papaya	Antracnosis Colletotrichum gloeosporioides	Aplicar a razón de 0.5 k en 200 L de agua.

INTERVALO DE APLICACIÓN: Depende de la severidad de enfermedad, así como de las condiciones climáticas, este pu variar de 4 a 15 días. Recuerde antes hacer monitoreo de pl y enfermedades.

INTERVALO ENTRE LA ÚLTIMA APLICACIÓN Y LA CO 8 días.

INTERVALO DE REINGRESO AL ÁREA TRATADA: E que se seque el rocío de la aplicación. Las áreas trat Vondozeb 80WP pueden ser inspeccionadas 24 horas de efectuada la aplicación. Si es en mezcla atender las re daciones de los otros plaguicidas.

OXICIDAD: No es fitotóxico a los cultivos, cuando se siguen mendaciones específicas de uso.

IBILIDAD: El fungicida Vondozeb 80 WP es compatible la e los plaguicidas de uso común, siempre que sea usado en nes normales. El producto es incompatible con sustancias como cal corriente. Recuerde siempre hacer una pre-mezc-

UCIONES Y ADVERTENCIAS DE USO:
ACENAMIENTO Y TRANSPORTE:
acenar el producto en su envase original bien cerrado y etiqueta- en un lugar seguro bajo llave, retirado de alimentos, fertilizantes y os agroquímicos. Manténgase en un lugar fresco, seco y alejado l calor y del fuego directo. De lo contrario el Vondozeb si se hidroli- uede ser inflamable y explosivo. Transporte el producto en su e original bien cerrado. No lo transporte con alimentos o es.
xponerlo al sol. No apilar más alto de tres paletas. No utilizar os. Cualquier saco caliente debe apartarse cuidadosamente a, teniendo cuidado de que no se derrame el producto duran- eración, en tal caso encharcar bien con agua y deshacerse ucto. Se descompone por prolongada exposición al aire y a d. Recomendable el uso de mascarilla contra polvos y vaciar los sacos. En caso de incendio utilice dióxido de oducto químicos secos o espumas. No emplear agua, casos de fuego importante. Recoger el agua de incendi- eger el medio ambiente. Por descomposición térmica ender humos tóxicos. Controlar la temperatura de los

LMACENAR ESTE PRODUCTO EN CASAS DE CIÓN. MANTÉNGASE FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS

MER, FUMAR O BEBER DURANTE EL MANEJO Y CIÓN DE ESTE PRODUCTO. BÁÑESE DESPUÉS E TRABAJAR Y PÓNGASE ROPA LIMPIA

DE INTOXICACIÓN:
mitos, cólicos, diarrea, pérdida de apetito, vértigo. En evero puede causar deshidratación y anemia. El contacto causa escozor, picazón y dermatitis.

S AUXILIOS:
ON: Si el paciente está consciente y no presenta convul- rovoque el vómito mediante una correcta dosis de jarabe de ana, seguido de 1-2 vasos de agua. En caso de no tener este dar de beber suficiente agua y provocar el vómito tocando la posterior de la garganta con el dedo.

NTACTO CON LA PIEL: Quítese las prendas contaminadas y se con abundante agua y jabón.

HALACIÓN: Retire la persona afectada del área contaminada a una mayor ventilación y manténgala en reposo.

NTACTO CON LOS OJOS: Lávese inmediatamente con agua e 15 minutos. En todo caso obtenga atención médica.

NUNCA DE A BEBER NI INDUZCA EL VÓMITO A PERSONAS EN ESTADO DE INCONSCIENCIA.

TO Y TRATAMIENTO MÉDICO: No tiene antídoto específico. amiento sintomático.

CENTROS NACIONALES DE INTOXICACIÓN

Institución	País	Nº Telé
Centro de Info. Toxicológica	Guatemala	(502) 251-
Karl Heusner, Memorial Hospital	Belice	(501) 231
Ministerio de Salud Pública y Asistencia	El Salvador	(503) 22 ext 140
Hospital Escuela	Honduras	(504) 23
Centro Nac. de Información Toxicológica	Nicaragua	(505) 22
Centro Nac. Control de las Intoxicaciones	Costa Rica	(506) 222
Centro de Investigación e Información de Medicamentos y Tóxicos	Panamá	(507) 269-2
Hospital Dr. Luis E. Aybar	Rep. Dom.	(809) 6848478
Hospital Dr. Francisco Moscoso	Rep. Dom.	(809) 681-2913

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE:

TÓXICO PARA PECES Y CRUSTÁCEOS.

NO CONTAMINE RÍOS, LAGOS Y ESTANQUES CON E PRODUCTO O CON ENVASES O EMPAQUES VACÍO

MANEJO DE ENVASES, EMPAQUES, DESECHOS Y REMANENTES: Aproveche el contenido completo del cuando lo vacíe, lave y enjuague tres veces con agua limpia y ue el resultado del enjuague a la mezcla ya preparada, inutili envases vacíos, perfórelos. Si el país cuenta con un programa de recolección y disposición de envases, entregue éste al cen recolección más cercano o deséchelo de acuerdo a las instru del distribuidor del producto.
En el caso de los derrames o desechos de plaguicidas recog con aserrín o con material absorbente y para producto recoger con una pala, recolectarlos en un recipiente her entregarlo al distribuidor o eliminarlos en un relleno sanita izado por el Ministerio de Salud.

EL USO DE LOS ENVASES O EMPAQUES EN FORM DIFERENTE PARA LO QUE FUERON DISEÑADOS, PON PELIGRO LA SALUD HUMANA Y EL AMBIENTE.

AVISO DE GARANTÍA:
Garantizamos el contenido de este producto siempre que se tre en su empaque original bien cerrado con su sello de G inalterado. No asumimos responsabilidades por posibles ocasionados por el mal uso de este producto. Sólo garantiza contenido declarado en la etiqueta y el uso recomendado en el to. El usuario adquiere el producto con pleno conocimiento d

FORMULADOR:
UPL LIMITED
Madhu Park, 11th Road,
Khar (W) Mumbai 400052 India.
Tel 91-22-2604-111

PAÍS	NÚMERO DE REG.	FECHA DE R RO
PANAMÁ	1188	01-Oc